



Endoscopia

DESCRIPCIÓN

Es un examen que permite observar el esófago, estómago y duodeno, a través de un tubo delgado y flexible. Puede producir molestias menores en la garganta y distensión abdominal, las que se alivian espontáneamente.

El instrumento se introduce por la boca, se aplica anestesia local con spray en faringe y además el paciente es sedado con un medicamento llamado Midazolam.

Las biopsias serán tomadas en los casos que el Médico considere necesario, y el pago no está incluido dentro del programa previamente cancelado, por lo que el trámite debe ser realizado posterior al examen en recepción.

El Test de Ureasa para la detección de *Helicobacter pylori* ya está incluido en el programa.

PREPARACIÓN

1. Debe tener un **ayuno de 8 horas**.
2. Pacientes en **tratamiento con anticoagulantes** no podrá realizarse este examen (ej. neo-sintróm®, coumadin®, eliquis, xarelto).
3. Pacientes en **tratamiento con antiagregantes plaquetarios** deben suspenderlo un día antes del examen o según indicación médica (ej. aspirina®/ácido acetilsalicílico, plavix®, iskimil®, agreplat®, clenet®, eurogrel®, poclokare®, ravalgen®).
4. Si es usuario de **dos antiagregantes plaquetarios** requiere pase e indicaciones de médico tratante.
5. Pacientes en **tratamiento con hipoglicemiantes orales e insulina** deben suspender dosis previa al examen. Pacientes insulinoquirientes deben ser agendados en las primeras horas de la mañana.
6. Pacientes **hipertensos** no deben suspender su medicamento el día del examen, es decir que deben tomarlo a la hora habitual con poca agua. Continuar con el resto de los medicamentos recetados regularmente con poca agua, a menos que haya recibido otras

INDICACIONES

1. Debe llegar **20 minutos antes de la hora de su examen**, para cancelar su programa en recepción.
2. Debe traer **orden médica, exámenes y/o endoscopias anteriores**.
3. Debe traer **cédula de identidad o pasaporte**.
4. Debe asistir con ropa y calzados cómodos, mujeres sin esmalte de uñas ni lápiz labial. Sin objetos de valor.
5. Debe **venir acompañado de un adulto (mayor 18 años)**, debido a que la pre medicación administrada puede producir desorientación y somnolencia. El acompañante debe permanecer en la sala de espera, mientras dure el procedimiento.
6. Posterior al examen **no estará en condiciones de conducir**. Si asiste en auto particular, el acompañante debe conducir.
7. Si es **alérgico debe informarlo**.
8. Si posee algún **problema Cardíaco** debe infórmalo, o deberá traer un pase de su cardiólogo, si su índice de masa corporal es mayor a 40.0 deberá agendar en un centro de mayor complejidad.

OTRAS INFORMACIONES

1. Se realiza **a contar de los 15 años y hasta los 80 años**.
2. Contraindicaciones:
instrucciones.
 - Paciente con tratamiento anticoagulante
 - Paciente embarazada o con posibilidad de embarazo
 - Paciente alérgico al látex
 - Paciente alérgico a benzodiazepinas
 - Paciente con problemas cardíacos debe traer **PASE CARDIOLOGICO**

o Si posee un índice de masa corporal mayor a 42.0 no se podrá realizar el procedimiento

3. Resultado de endoscopia se le entrega el mismo día al acompañante al salir del examen.